

2015. gadā atjaunotās Eiropas rekomendācijas hroniska C hepatīta ārstēšanai

pacienti ar monoinfekciju vai VHC/HIV koinfekciju

atbilstoši genotipam

Pacienti bez cirozes

Pacientu grupa	PegIFN- α , RBV un sofosbuvirs	PegIFN- α , RBV un simeprevirs	Sofosbuvirs un RBV	Sofosbuvirs un ledipasvirs	Paritaprevirs/r, ombitasvirs un dasabuvirs	Paritaprevirs/r un ombitasvirs	Sofosbuvirs un simeprevirs	Sofosbuvirs un daklatasvirs
1.a genotips	12 nedēļas	12 nedēļas (iepriekš neārstēti vai relapsēri)	Nelieto	8 – 12 nedēļas bez RBV	12 nedēļas ar RBV	Nelieto	12 nedēļas bez RBV	12 nedēļas bez RBV
1.b genotips	12 nedēļas	24 nedēļas (iepriekš daļēja vai nulles atbilde)			12 nedēļas bez RBV			
2. genotips	12 nedēļas	Nelieto	12 nedēļas	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	12 nedēļas bez RBV
3. genotips	12 nedēļas	Nelieto	24 nedēļas	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	12 nedēļas bez RBV
4. genotips	12 nedēļas	12 nedēļas (iepriekš neārstēti vai relapsēri) 24 nedēļas (iepriekš daļēja vai nulles atbilde)	Nelieto	12 nedēļas bez RBV	Nelieto	12 nedēļas ar RBV	12 nedēļas bez RBV	12 nedēļas bez RBV

Pacientiem ar kompensētu cirozi (*Child-Pugh A*)

Pacientu grupa	PegIFN- α , RBV un sofosbuvirs	PegIFN- α , RBV un simeprevirs	Sofosbuvirs un RBV	Sofosbuvirs un ledipasvirs	Paritaprevirs/r, ombitasvirs un dasabuvirs	Paritaprevirs/r un ombitasvirs	Sofosbuvirs un simeprevirs	Sofosbuvirs un daklatasvirs
1.a genotips	12 nedēļas	12 nedēļas (iepriekš neārstēti vai relapsēri)	Nelieto	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV vai 24 nedēļas ar RBV, ja negatīva paredzamā atbilde	12 nedēļas ar RBV	Nelieto	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV
1.b genotips	12 nedēļas	24 nedēļas (iepriekš daļēja vai nulles atbilde)		12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV vai 24 nedēļas ar RBV, ja negatīva paredzamā atbilde	12 nedēļas bez RBV		12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV
2. genotips	12 nedēļas	Nelieto	16 – 20 nedēļas	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	12 nedēļas bez RBV
3. genotips	12 nedēļas	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	Nelieto	24 nedēļas ar RBV
4. genotips	12 nedēļas	12 nedēļas (iepriekš neārstēti vai relapsēri) 24 nedēļas (iepriekš daļēja vai nulles atbilde)	Nelieto	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV vai 24 nedēļas ar RBV, ja negatīva paredzamā atbilde	Nelieto	24 nedēļas ar RBV	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV	12 nedēļas ar RBV vai 24 nedēļas bez RBV

Saīsinājumi

PegIFN- α – pegilētais alfa interferons

RBV – ribavirīns

R - ritonavirs

Sagatavoja: Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija

Atsauce: www.easl.eu