

# 10 HIV simptomi

## Neskaidras etioloģijas drudzis

## Biežas, recidivējošas infekcijas

biežas pneimonijas, biežas strutainas infekcijas

## STS un hepatīti

Seksuāli transmisīvas slimības, hepatīti, t.sk. toksisks hepatīts

## Herpes zoster

## Onkoloģija

pirmsvēža stāvokļi, piem., cervikāla displāzija

## Ādas un gļotādas slimības

seborejisks dermatīts, akne, psoriāze, kandidoze (mutes un vagināla)

## Tonsilīts, limfadenopātija

mononukleoze vai infekciozai mononukleozei līdzīgs sindroms


## Hroniska caureja

(> 3 nedēļas)

## Izmaiņas asins ainā

trombocitopēnija, leukopēnija, pancitopēnija

## Krišanās svarā



# PIEVĒRSIET uzmanību!

## HIV infekcijai simptomu var nebūt!



**Veiciet HIV testu** ikvienam pacientam, ko nosūtāt uz **PLĀNVEIDA OPERĀCIJU!**



iesakām veikt HIV testu ikvienam pacientam vismaz reizi 1–3 gados, neatkarīgi no pacienta dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa un dzīvesveida.

**Aicinām neaizmirst par vidusskolniekiem!**

Sagatavoja: Latvijas Infektoloģijas centra speciālisti Dr. med. Inga Ažiņa, asoc.prof. Gunta Stūre, dr. Anastasija Šangirejeva, dr. Kristīne Ābelīņa, dr. Gunita Saulīte, prof. Baiba Rozentāle sadarbībā ar ģimenes ārstiem dr. Aini Dzalbu un dr. Ligitu Vulfu.